
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX.

DLP21-10-87046502



verlissements agricoles

Abonnement 160,00 F

annuel:

à l'ordre

Régisseur de Recettes

D.R.A.F. du Nord Pas-de-Calais

SERVICE REGIONAL DU NORD-PAS-DE-CALAIS Cité Administrative - 59048 LILLE Cedex - Tél. (20) 52.00.25

STATION D'AVERTISSEMENTS LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOSANITAIRES Z.A.L. - Rue Roger-Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. (21) 28.27.27



spécial grandes cultures

BULLETIN TECHNIQUE Nº 30 DU 15 OCTOBRE 1987

COLZA: Désherbage

ORGE D'HIVER : Peu de pucerons

COLZA

Stade 6 feuilles très souvent dépassé. Les conditions de végétation sont excellentes. La croissance est rapide



POUR LES AVERTISSEMENTS
TELEMATIQUES
APPELEZ 1e 36 15
CODE ARTEL
OU
CODE EDIMK

Les Altises ont été observées en faible nombre et quelques morsures ont été couramment notées sur les premières feuilles, sans gravité. Les conditions météorologiques ont été peu favorables à l'activité de l'altise et ont par contre bénéficié à la végétation.

Le principal ravageur à craindre en ce moment est la limace. Les populations sont importantes, en particulier dans tous les secteurs d'argile à silex (Hucqueliers, Fruges, etc). Les produits utilisables et les conditions d'emploi ont été présentés dans nos précédents bulletins.

Les mauvaises herbes aussi profitent du temps poussant. Pour tous les colzas semés en dates et conditions normales pour la région, les applications d'herbicides en post-levée peuvent être entreprises sans trop tarder, surtout sur dicots.

Quelques symptômes de mildiou des cruciferes : tache blanc-gris pulvérulente sur le dessous des feuilles. Intervention inutile.

Pucerons verts : apparition en nombre sur les colzas cette année, ce qui constitue un fait nouveau pour la région. La principale espèce en cause est Myzus Persicae. Pas de nuisibilité marquée, ne pas intervenir.

Nombreuses galeries de mouches mineuses dans les feuilles. Sans gravité apparente.

ESCOURGEONS - ORGES D'HIVER

Excellente levée enregistrée partout. Le stade dominant est le stade 1 feuille - levée en cours. Quelques semis précoces (rares) sont plus avancés.

PUCERONS NOIRS (Rhopalosiphum padi).

Rappelons que ce puceron est le vecteur de la Jaunisse Nanisante. Cette maladie à virus a été à l'origine de quelques dégâts sur le Littoral (Calaisis, Montreuillois) en 1986-1987, la situation étant beaucoup plus saine ailleurs.

7115

ISSN 0757-6609 imprimerie de la Station Nord - Pas-de-Calais - Picardie - Directeur-gérant Ch. de la MESSELIERE - 🗈 Service de la Protection des Végétaux Arras 198

Dernières données du piège à succion de Loos-en-Gohelle :

Date	30/9	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10	11/10	12/10
Rhopalosiphum padi	8	12	22	42	86	77	9	0	0	1	0	54	27

Petit vol jusqu'au 5 octobre, date à laquelle peu d'escourgeons étaient levés. Arrêt total du vol pendant 5 jours à cause de la tempête, puis début de reprise.

A titre indicatif, quand le vol est bien enclanché, les captures sont de 150 à 1000 en moyenne.

Nos comptages en parcelles font état de tres faibles contaminations.

Les repousses sont de manière générale peu virosées, sauf dans les secteurs contaminés l'année dernière. Très faibles populations de pucerons hébergées sur ces repousses.

En conséquence, il est inutile de précipiter les traitements pour le moment.

Par contre en ce qui concerne le désherbage, il est bon de rappeler que de nombreux blés en 1987 ont été infestés par les vulpins. Ces mêmes vulpins en surnombre, levent très rapidement dans les parcelles d'escourgeon ainsi que beaucoup d'autres mauvaises herbes.

Les desherbages de post-levée devront être pratiqués rapidement des le stade 3 feuilles. Ne pas réduire les doses, si les vulpins sont nombreux.

Tableau des insecticides homologués contre les pucerons Vecteurs de la Jaunisse Nanisante

Matiere Active	Dose/ha de m.a.	Spécialités commerciales	Dose/ha de S.C.		
fenvalerate	25 g	SUMICIDIN 10 (Agrishell)	0,25 1		
deltamethrine	7,5 g	DECIS CE (Procida)	0,3 1		
cy fluthrine	15 g	BAYTHROID (Bayer)	0,3 1		
fluvalinate	48 g	MAVRIK (Sandoz)	0,2 1		
cyhalothrine	7,5 g	KARATE (Sopra)	0,15 1		
bifenthrine	7,5 g	TALSTAR (Pépro)	0,075 1		
cypermethrine	20 g	Diverses spécialités			
bromophos méthyl	375 g	Diverses spécialités			
permethrine	62,5 g	AMBUSH (La Quinoléine)	0,25 1		

DERNIERE HEURE : AGRISHELL annonce l'arrivée sur le marché d'un nouvel insecticide homologué pour cet usage :

SUMI-ALPHA a 0,25 I/ha